### Recuerde que un niño/a:

A los 3 meses: sonríe, es capaz de fijar la mirada,

sostiene la cabeza.

A los 6 meses: tiene interés e intención de coger

objetos, usa alguna de las dos manos.

A los 9 meses: se sostiene sentado, se interesa por

mirar y tocar las cosas, parlotea.

A los 12 meses: es capaz de sostenerse de pie asido

a un mueble, busca la comunicación

con el adulto, explora nuevos jueguetes.

A los 18 meses: camina, conoce el nombre de objetos

o personas familiares.







OBRA SOCIAL DE OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS, SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

La Superintendencia de Servicios de Salud tiene habilitado un servicio telefónico gratuito para recibir desde cualquier punto del país, consultas, reclamos o denuncias sobre irregularidades de la operatoria de traspasos.

El mismo se encuentra habilitado de Lunes a

Viernes de 10 a 16 hs, llamando al

0800-222-72583

Culpina 25/31 • CABA • C1406ENA Tel.: 4612-2000 Líneas Rotativas www.osoetsylra.org

# **DISCAPACIDAD**



## Prevenir es curar

Lo que debemos saber y quizás no conocemos.

2011/2012



# Discapacidad

Es cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano.

La discapacidad se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño de una actividad rutinaria normal, los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o surgir como consecuencia directa de la deficiencia o como una respuesta del propio individuo, sobre todo la psicología, a deficiencias físicas, sensoriales o de otro tipo.

#### PREVENCION DE LA DISCAPACIDAD

### **ETAPA PRENATAL**

Durante este período, lo importante es mantener un control mediante evaluaciones programadas de la embarazada con su médico de confianza o en cualquier centro de salud; con ello se prodrá vigilar la evolución del feto y lograr una efectiva preparación para el momento del parto.



# ASPECTOS IMPORTANTES PARA PREVENIR LA DISCAPACIDAD

- 1. Ofrecer a los padres y las madres información sobre aquellas situaciones predisponentes o que suponen mayor riesgo de deficiencia para sus hijos: hipertensión arterial de la madre, diabetes, isoinmunización con factor Rh, edad de los progenitores, enfermedades infectocontagiosas, drogadependencias, malnutrición, alteraciones metabólicas o genéticas, embarazo gemelar o múltiple, partos prematuros, niños/as nacidos con muy bajo peso teniendo en cuenta la edad gestacional.
- Informar sobre los riesgos que corren los lactantes y los niños/as de corta edad de sufrir accidentes dentro y fuera del hogar.
- Favorecer la calidad de vinculación en el entorno familiar del niño/a y resaltar la importancia que tiene una adecuada estimulación física, psicoafectiva y social para propiciar el desarrollo.
- **4.** Evite embarazos en edades muy tempranas o tardías. Busque consejo médico para conocer los antecedentes hereditarios, durante el embarazo.
- **5.** No tome medicamentos que puedan dañar a su bebe. Realice el control prenatal y procure comer alimentos ricos en hierro, vitaminas y minerales.
- Evite las drogas, alcohol y cigarrillos. Lleve al niño al control de crecimiento y desarrollo.

### LOS CUATRO GRADOS DE RETARDO MENTAL

Existen varios grados de retardo mental, en función del coeficiente intelectual: **leve**, **moderado**, **severo**, **profundo**.

#### **PRINCIPALES CAUSAS**

- Alteraciones genéticas.
- Enfermedades prenatales, perínatales, postnatales.
- Cretinismo (falta de yodo).
- Falta de oxígeno al nacer, uso inadecuado de fórceps.
- Bebes prematuros o de bajo peso al nacer
- Fiebres altas causadas por infección del cerebro (meningitis).
- Deshidratación.
- Golpes o heridas muy fuertes en la cabeza.
- De tipo ambiental; que puedan afectar a cualquier niño/a sano, mas aún a los que nacieron desnutridos o carecen de estímulos, afecto y oportunidades.